


180. Tordo bottaccio *Turdus philomelos* C.L. Brehm

D • Singdrossel

E • Song Thrush

F • Grive musicienne



- **DISTRIBUZIONE:** Specie politipica. In Italia è migratrice regolare e svernante. La sottospecie tipo è nidificante diffusa sull'arco alpino, sull'Appennino e, molto localizzata, in alcune aree pedemontane e pianeggianti (a,b). Altitudine: 100-2000 m; scarsa sotto i 500 m, rara al piano. Status: stabile; localmente fluttuante.
- **HABITAT:** Nidifica in ambienti boscosi, alberati e arbustati di conifere, latifoglie e misti. Predilige le formazioni arborescenti folte di essenze spontanee, i luoghi freschi e ombrosi con suolo sgombro, umido e ricco di humus. Occasionalmente si insedia in vicinanza delle abitazioni, anche in parchi e giardini.
- **SITUAZIONE DEL NIDO:** Tra le biforcazioni principali o secondarie degli arbusti, tra le ramificazioni delle piante rampicanti, sui rami laterali degli alberelli, spesso accanto al tronco. Di solito, seppure nel folto, non è difficile da individuare. Essenze preferite: (Alpi) conifere (*Picea* e *Abies*); (Appennini, basse quote) *Sambucus*, *Clematis*, *Hedera*, *Salix*; (Appennini, medie e alte quote) *Fagus*, *Carpinus*, *Juniperus* (ad alberello). Altezza dal suolo 0-10 m: 1% 0-1 m, 92% 1-4 m, 6% 4-7 m, 1% oltre 7 m; media ca. 3 m (n=54).
- **NIDO:** A coppa, voluminoso, compatto. Composto da stecchi, steli, muschio, radichette, erbe e foglie secche, occasionali pezzi di carta o plastica. Esterno di solito con abbondante muschio verde. Interno uniformemente rivestito da un sottile strato di fango misto a piccoli frammenti di polpa chiara di legno fradicio. Le uova vengono deposte e covate direttamente nella coppa liscia e spoglia, d'aspetto incartapecorito. Costruito in 3-5 giorni dalla sola ♀. Dimensioni (cm): diam. 14.1 (9.5-16); alt. 12.3 (9-25); diam. int. 9.8 (9-10.5); prof. coppa 7.2 (6-8.5); (n=18). Peso (g): 90-110 (77-120), media 90.8 (n=18).
- **UOVA:** Ovali, lisce, poco lucide. Variabilità moderata. Simili nella covata. Fondo variamente sfumato di azzurro o verde-azzurro. Macchie e piccole chiazze arrotondate nere, bruno-marrone, grige. Le chiazze possono avere un alone rossiccio. La macchiettatura è rada su tutta la superficie, spesso alquanto più vistosa e addensata verso il polo maggiore. Raramente bianchicce, senza macchie o quasi. Nota: uova dalle caratteristiche peculiari, di facile identificazione.
- **DEPOSIZIONE:** Intervallo 1 giorno. Accertata dai primi di marzo a luglio. Max, alle quote medie e basse: 1ª covata dalla prima metà di aprile, 2ª da fine maggio, 3ª in luglio. Europa: possibile in tutti i mesi dell'anno (c). Finlandia: da fine aprile (c).
- **COVATE:** Due, a volte tre; possibili quattro. Covate di rimpiazzo ricorrenti. Osservate di 3-5 (2-6) uova. Su 44 covate: 25% 3 uova; 52% 4; 21% 5; 2% 6; media 4.0. Europa: 3-5 (2-6) uova (c). Inghilterra: media 4.7 (n=1155) (c).
- **INCUBAZIONE:** Effettuata dalla sola ♀, raramente assistita dal ♂ (c). Di solito inizia dall'ultimo uovo e dura 13.4 (10-17) giorni (n=79) (c).

Dimensioni (mm), volume calcolato (cm³) e pesi (g) delle uova fresche e dei gusci

<i>Turdus philomelos philomelos</i>						
	n	\bar{x}	s	max	min	
Lungh.	46	27.4	1.29	31.0 (21.5)	24.5 (20.0)	Nord Italia (Pazzuconi)
Largh.	46	20.7	0.66	21.9 (27.3)	18.7 (26.3)	
Volume	46	6.0	0.58	7.3	4.7	
Uovo	27	6.19	0.332	6.88	5.59	
Guscio	43	0.3425	0.0267	0.4024	0.2476	
<i>Turdus philomelos clarkel</i>						
Lungh.	209	27.00		30.9 (21.2)	23.5 (19.4)	Mitteleuropa (Makatsch)
Largh.	209	20.58		22.2 (29.5)	18.7 (25.8)	
Uovo		5.55				
Guscio	209	0.321		0.40	0.25	
Lungh.	100	27.60		31.1 (21.0)	24.7 (20.2)	Gran Bretagna (Jourdain, in Makatsch)
Largh.	100	20.90		23.0 (28.0)	19.2 (27.0)	



Cova di Tordo
Intacco nel nido
 (foto A. Pazzuconi)